



キーワード検索

製品名で検索

全ての企業から検索

英語版の有無を問わない

更に絞り込む

以上の内容で検索する

製品名を索引から探す

あ か さ た な
は ま や ら わ医薬品情報データベース
iyakuSearch添付文書は(財)日本医薬情報センター
(JAPIC)のデータベース「iyakuSerch」に
リンクしています。

くすりのしおり

内服剤

2013年7月改訂

エーザイ株式会社

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名 : レキソタン錠5

主成分 : プロマゼパム (Bromazepam)

剤形 : 淡黄赤色の錠剤、直径8.0mm、厚さ2.3mm

シート記載 : (表)レキソタン5、Lexotan5
(裏)Lexotan5、レキソタン5mg

この薬の作用と効果について

脳のベンゾジアゼピン受容体に結合してGABA神経系の作用を増強し、不安、緊張、抑うつ、強迫、恐怖や睡眠障害を改善します。通常、神経症、うつ病、心身症の治療や麻酔前投薬に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。緑内障、重症筋無力症である。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください)。

用法・用量(この薬の使い方)

- あなたの用法・用量は(医療担当者記入)
- 神経症、うつ病 : 通常、成人は1日主成分として6~15mgを2~3回に分けて服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。この薬は1錠中に主成分5mgを含みます。心身症 : 通常、成人は1日主成分として3~6mgを2~3回に分けて服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。この薬は1錠中に主成分5mgを含みます。麻酔前投薬 : 通常、成人は1回1錠(主成分として5mg)を手術前日の就寝前または手術前に服用しますが、年齢・症状・疾患により適宜増減されます。
- 飲み忘れた場合、神経症、うつ病、心身症では、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。麻酔前投薬では、手術前夜の寝つく前に気がついた時はすぐに飲んでください。手術日朝に気がついた時は飲み忘れた分は飲まないで、飲まなかったことを医師または看護師に伝えてください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- 眠くなったり、注意力・集中力・反射運動能力などが低下することがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作を避けてください。
- 飲酒はこの薬の作用を強めますので避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと(副作用)

主な副作用として、発疹、かゆみ、眠気、ふらつき、めまい、口渇、疲労感、脱力感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 薬を飲まずにはいられない、薬をやめると現れる症状(けいれん、意識障害、手足のふるえ、不眠、不安、幻覚、妄想など)[依存性]
- 興奮、意識の混乱[刺激興奮、錯乱]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外にも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。



くすりの適正使用協議会

▶ お問い合わせ

[このページの先頭に戻る](#)

Copyright 2015 くすりの適正使用協議会 All rights reserved.